

Fièvre typhoïde.

maligne, putride, bilieuse muqueuse des anciens.

gastro entérite - Broussais

fièvre entéro-mésentérique Petit & Serre[s]

dothiésentérie - Bretonneau - δοθιέν, bouton, pustule, ἐντέρον (entraille)

entéro mésentérique typhoïde - Bouillaud

entérite folliculeuse, de qqes auteurs

— —
une lésion anatomique ^{constante} & spéciale caractérise les fièvres continues graves des anciens

3 périodes. - débute un matin par un mal de tête. faiblesse, frisson, épistaxis. diarrhées

1^{ère} p. hébétude, céphalalgie jusqu'à la fin du premier septennaire. - étourdissement

vertige, saignement de nez. - insomnie. - pouls large & fréquent. La langue rouge

X sur les bords & à la pointe. - soif. Le ventre est sensible surtout dans la région
iliaque, droite - les lèvres deviennent arides & luisantes. le ventre est ballonné.

2^e p. du 7^e au 9^e jour. sur l'abdomen, sur la poitrine des taches lenticulaires

rosées, disparaissant sous la pression, non coniques. Sudamina dans les aisselles
au cou,

en même temps que paraissent ces nouveaux signes le mal de tête dis a disparu, somnolence
faiblesse plus gde. - qqfois gdes douleurs aux articulations. - coma - surdité. - yeux rouges

X la langue fendillée, racornie, couverte d'un enduit noirâtre. diarrhées involontaires.

X - respiration gênée. escchares gangreneuses - désordres nerveux, soubresauts.

3^e p. décide du mode de terminaison - elle commence à des époques très variables, généralement
du 15^e au 30^e jour. rarement plutôt.

—
terminaison.

Lorsqu'elle doit ^{être} heureuse, les symptômes diminuent peu à peu, la stupeur se dissipe

la fièvre tombe, la bouche se nettoie, la respiration devient plus libre, la peau subit

X une sorte de desquamation. - Il est très habituel de voir les cheveux tomber.

" L'appétit revient avec une violence à laquelle il est indispensable de résister. "

Mais la convalescence est longue, un ou deux mois, les facultés intellectuelles sont lentes
à se rétablir.

qqfois au milieu de la convalescence une douleur brusque, dans un point de l'abdomen

X suivie de tous les signes d'une péritonite aiguë due à une perforation intestinale

Les signes de cet accident s'arrêtent qqfois tout à coup.

traitement. émissions sanguines rapprochées. (Bouillaud) ventouses scarifiées sur le ventre

répétées à court intervalle dans les premiers jours - diète, boissons rafraîchissantes

- cataplasmes sur le ventre.

méthode purgative (Delarrouque) purgatifs salins ou huileux