

en un chien a le charbon si on lui injecte /les/du sang vicié par l'irritation artificielle du nerf peumo-gastrique
 " la connaissance des maladies de l'estomac est la clef de la pathologie " Broussais.

une trop gde quantité de matières chyliifiables entraîne la gastro entérite. si une nourrice a un lait trop fort
 l'enfant aura des indigestions - son lait a trop de caséum. il faut l'étendre d'une
 certaine quantité d'eau.

l'influence nerveuse trouble les sécrétions. - Le lait d'une nourrice peut être modifiée & agir comme un poison

eu
 si elle a une émotion morale. - Le venin de certains animaux est plus terrible
 s'ils sont en colère.

Entérite Folliculeuse , fièvre typhoïde. - Gastro entérite adynamique (Broussais) Dothiéntérie (Littre)
 δοθην pustule, εντερον, intestin

- maladie caractérisée par l'altération des follicules muqueux de l'intestin grêle.

des individus ont succombé à tous les symptômes de la fièvre typhoïde, & sur
 lesquels on n'a pu constater non seulement l'exanthème intestinal mais même
 aucune altération du tube digestif qui pût expliquer la mort. (55 t 1^{er})

- diminution de la consistance du cœur - ramollissement du ventricule gauche. Louis
 a cru pouvoir rattacher à cette altération l'affaiblissement du pouls

La rate " que l'on peut considérer comme une dépendance probable de l'appareil
 circulatoire, est en général augmentée de volume & ramollie.

les ganglions mésentériques sont plus volumineux d'un tissu rouge ou brunâtre
 qqfois remplis de pus.

X Symptômes :

La muqueuse buccale est rouge, recouverte d'un enduit muqueux, ou d'une matière
ses bords présentent un petit liseré blanc
 comme crémeuse. Dans qqe[s] cas, elle présente une exhalation de sang qui tend à se
 coaguler & qui produit alors des croûtes jaunes ou noires. .. à une époque plus
 avancée elle devient sèche se racornit & se couvre d'une croûte noire & épaisse -

Les pétéchie se montrent du 8^e au 15^e jour, sur la partie inférieure & moyenne du
 thorax & sur la partie supérieure de l'abdomen.

M^e Chomel a administré des chlorures, en boissons, en lavements, en lotions

Hémorragies du tube digestif Le sang fourni par l'estomac est constamment noir, tandis que celui qui provient d'une
 hémoptysie avec lequel on pourrait le confondre est rouge & rutilant. cependant si
 le sang est rejeté aussitôt après sa sortie du vaisseau, il devient très difficile de se
 prononcer. (77)

choléra asiatique se distingue de l'entérite en ce que : la sensibilité du ventre est toujours plus grande
 le mouvement fébrile intense, la peau sèche. - de la colique de plomb par la constipation
 qui l'accompagne " 103.

les individus morts dans la période algide & présentant un refroidissement complet
 de tout le corps se réchauffent après la mort & conservent une chaleur notable jusqu'à
 ce que la rigidité commence.

qqfois les cadavres ont le poumon anémié.

X
 P. cite
 la page.

