

Fièvres typhoïdes

Pathologie interne Jaccoud

Le poison générateur de la fièvre typh. est inconnu. il est contenu dans les produits des décompositions animales & végétales, il peut donc être considéré comme l'expression d'une intoxication putride, spéciale.

1° il peut être contenu dans l'eau, dans l'air, dans les substances. c'est là son origine extrinsèque. 2° il naît dans l'organisme sous l'influence de certaines conditions mauvaises. c'est là l'origine spontanée 3° Il est reproduit par le malade, transmis aux individus sains. c'est là l'origine contagieuse

Selon Stich, l'organisme animal renferme toujours en lui les matériaux d'empoisonnement putride contenus soit dans l'intestin soit dans l'exhalation pulmonaire ; à l'état normal l'influence nocive de ces produits est annihilée par les fonctions même[s] de l'organisme des masses muqueuses correspondantes ou bien par l'élimination rapide ou la transformation des matières résorbées.

prodromes. qqfois un catarrhe gastrique. les phénomènes sont tout à fait semblables à ceux d'un catarrhe de l'estomac - un vomitif ne produit qu'un soulagement momentané 24 h. après la céphalalgie reparaît avec le malaise & la fièvre.

Le gonflement de la rate n'est appréciable que du vers le 5^e ou 6^e jour

une angine catarrhale, peut dès les premiers jours égarer le diagnostic. et elle est qqfois le seul symptôme de la fièvre typhoïde commençante.

désordres cérébraux vers la fin de la 1^{ère} semaine - douleurs lombaires. - cauchemars - indifférence. - apathie intellectuelle - lenteur des réponses -

la fièvre *f* guérit

La fièvre typhoïde guérit d'autant mieux que la roséole est plus abondante.

prquoi ? on n'en sait rien. y a-t-il une compensation entre le processus cutané & le processus intestinal ?

la perforation intestinale est rare avant la 3^e semaine : Elle a lieu à propos d'un mouvement brusque, d'un effort. qqfois elle arrive dans des f. typh. légère[s]

L'accident est révélé par la fréquence & la petitesse du pouls, le météorisme ^{du ventre} du po

Les accidents laryngés peuvent acquérir dans la convalescence leur intensité plus gde & tuer par œdème glottique.

la chute de la fièvre qui signale le début de la convalescence ne met pas terme au péril.

3 traitemnts. 1° Saignées coup sur coup. 2° vomitifs répétés : 3° calomel à fortes doses

inutile - La fièvre typhoïde ne peut être coupée - Ce sont les formes abortives qui ont fait croire au succès du traitement abortif.